

Alonso Ferrero, Jair; Matías del Pozo, Vanesa; Sánchez Mínguez, Alicia; Pino Vázquez, Asunción.  
Servicio de Neonatología. Hospital Clínico Universitario de Valladolid, España.

## LESIÓN EN LA ENCÍA DE UN NEONATO: QUISTE DE ERUPCIÓN

### Introducción

Las lesiones en la cavidad oral (encías, lengua, labios, paladar) pueden ser *hallazgos sin importancia* que forman parte del proceso de desarrollo normal de los niños o indicar *patología muy variada*, desde tumores benignos como los hemangiomas hasta manifestaciones de enfermedades sistémicas (gingivitis por VIH).



### Resumen del caso

Recién nacido a término de 39 semanas de peso adecuado para la edad gestacional (3520 gramos) en el que se objetiva en la primera revisión del recién nacido un **bultoma en la zona medial de la encía inferior**, de consistencia gomosa, coloración rosada y mínimamente violácea subyacente. No presenta bultomas a otros niveles. Mancha de Bartz extensa en región lumbar. Resto de exploración física por aparatos sin alteraciones.

Como antecedentes obstétricos a destacar: es el cuarto hijo de la serie. Embarazo controlado y de curso normal, serologías negativas salvo rubeola inmune. Parto instrumentado con fórceps por bradicardias en el expulsivo. Alimentado con lactancia artificial por deseo de los progenitores.

### Conclusiones

- Los quistes de erupción son lesiones de las encías que se asocian con la erupción de los dientes de leche (primarios) o definitivos.
- Suelen ser más frecuentes en **varones** que en mujeres.
- Se presentan entre los **6 y 11 años**.
- Si asocian hematoma se denominan hematomas de erupción.
- ¿Tratamiento? Se resuelven de forma **espontánea** pero si el diente no erupciona en un máximo de dos semanas, se recomienda **derivar a Odontología** para realizar una incisión en la encía y permitir la salida del diente involucrado.